

Proba de

Código

CSPC003

Matemáticas

Matemáticas



1. Formato da proba

Formato

- A proba consta de vinte cuestiós distribuídas en catro problemas, do seguinte xeito:
 - Problema 1: cinco cuestiós tipo test.
 - Problema 2: cinco cuestiós tipo test.
 - Problema 3: cinco cuestiós tipo test.
 - Problema 4: cinco cuestiós tipo test.
- As cuestiós tipo test teñen tres posibles respuestas, das que soamente unha é correcta.

Puntuación

- Puntuación: 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.
- Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,125 puntos.
- As respuestas en branco non descontarán puntuación.

Materiais e instrumentos que se poden emplegar durante a proba

- Calculadora científica non programable.

Duración

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.



2. Exercicio

Problema 1

Un Estado compra 540.000 barrís de petróleo a tres subministradores diferentes, que o venden a 102, 110 e 120 dólares o barril. A factura total ascende a 60.000.000 dólares.

Un Estado compra 540.000 barriles de petróleo a tres suministradores diferentes, que lo venden a 102, 110 y 120 dólares el barril. La factura total asciende a 60.000.000 dólares.

- 1.** Se do primeiro subministrador recibe o 30 % do total do petróleo comprado, cal é a cantidade comprada a cada subministrador?

Si del primer suministrador recibe el 30 % del total del petróleo comprado, ¿cuál es la cantidad comprada a cada suministrador?

A 140.000 barrís do de 102 \$; 210.000 do de 110 \$; e 188.500 do de 120 \$.

140.000 barriles del de 102 \$; 210.000 del de 110 \$; y 188.500 del de 120 \$.

B 162.000 barrís do de 102 \$; 179.800 do de 110 \$; e 200.000 do de 120 \$.

162.000 barriles del de 102 \$; 179.800 del de 110 \$; y 200.000 del de 120 \$.

C 162.000 barrís do de 102 \$; 188.400 do de 110 \$; e 189.600 do de 120 \$.

162.000 barriles del de 102 \$; 188.400 del de 110 \$; y 189.600 del de 120 \$.

- 2.** Resolva a ecuación logarítmica: $\log x + \log 2 = 1$.

Resuelva la siguiente ecuación logarítmica: $\log x + \log 2 = 1$.

A $x = 0,5$.

B $x = 5$.

C $x = 10$.

- 3.** Resolva a seguinte ecuación exponencial: $3^x + 3^{1-x} = 4$.

Resuelva la siguiente ecuación exponencial: $3^x + 3^{1-x} = 4$.

A A solución é $x = 0$.

La solución es $x = 0$.

B Ten dúas soluciós: $x = 0$ e $x = 1$.

Tiene dos soluciones: $x = 0$ y $x = 1$.

C Ten dúas soluciós: $x = 1$ e $x = 3$.

Tiene dos soluciones: $x = 1$ y $x = 3$.



4. Canto é a suma S e o produto P das solucións da ecuación de 2º grao $x^2 - 10x + 24 = 0$?

¿Cuánto es la suma S y el producto P de las soluciones de la ecuación de 2º grado $x^2 - 10x + 24 = 0$?

- A** A suma é S = 10, e o produto P = 24.

La suma es S = 10, y el producto P = 24.

- B** A suma é S = 14 e o produto P = 240.

La suma es S = 14 y el producto P = 240.

- C** A suma é S = 24 e o produto P = 10.

La suma es S = 24 y el producto P = 10.

5. Cantas solucións reais ten a seguinte ecuación bicadrada: $x^4 + 5x^2 + 4 = 0$?

¿Cuántas soluciones reales tiene la siguiente ecuación bicuadrada: $x^4 + 5x^2 + 4 = 0$?

- A** 4.

- B** 2.

- C** 0.



Problema 2

Sexa f a función definida por $f(x) = (x-1)^{-2}$, e g a función definida por $g(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

Sea f la función definida por $f(x) = (x-1)^{-2}$, y g la función definida por $g(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

6. Ache o dominio das funcións.

Halle el dominio de dichas funciones.

A $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$ e $\text{Dom}(g) = (-\infty, 0]$.

Dom(f) = $\mathbb{R} - \{1\}$ y Dom(g) = $(-\infty, 0]$.

B $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$ e $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$.

Dom(f) = $\mathbb{R} - \{1\}$ y Dom(g) = \mathbb{R} .

C $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ e $\text{Dom}(g) = (-\infty, 0]$.

Dom(f) = \mathbb{R} y Dom(g) = $(-\infty, 0]$.

7. Estude a continuidade das funcións f e g.

Estudie la continuidad de las funciones f y g.

A f e g son continuas en toda a recta real.

f y g son continuas en toda la recta real.

B f é continua en $\mathbb{R} - \{1\}$ e g éo en $(-\infty, 2]$.

f es continua en $\mathbb{R} - \{1\}$ y g lo es en $(-\infty, 2]$.

C f é continua en $\mathbb{R} - \{1\}$ e g éo en toda a recta real.

f es continua en $\mathbb{R} - \{1\}$ y g lo es en toda la recta real.

8. Teñen asíntotas estas dúas funcións?

¿Tienen asíntotas estas dos funciones?

A A función f(x) non ten asíntotas, e g(x) ten dúas, que son $x = 1$ e $y = 0$.

La función f(x) no tiene asíntotas, y g(x) tiene dos, que son $x = 1$ e $y = 0$.

B A función f(x) ten dúas asíntotas, que son $x = 1$ e $y = 0$, e g(x) non ten ningunha.

La función f(x) tiene dos asíntotas, que son $x = 1$ e $y = 0$, y g(x) no tiene ninguna.





C Ningunha das dúas funcións ten asíntotas.

Ninguna de las dos funciones tiene asíntotas.



9. Asocie a cada gráfica unha das seguintes expresións analíticas:

Asocie a cada gráfica una de las siguientes expresiones analíticas:

a) $y = \frac{1}{x+4}$	b) $y = \sqrt{x-1}$	c) $y = \frac{1}{x} - 4$	d) $y = \sqrt{2-x}$
I) 	II) 	III) 	IV) 

A I c); II b); III a); IV d).

B I a); II b); III c); IV d).

C I c); II d); III a); IV b).

10. Cal das seguintes expresións analíticas se corresponde coa elipse de semieixes 4 e 2?

¿Cuál de las siguientes expresiones analíticas se corresponde con la elipse de semiejes 4 y 2?

A $4x^2 + 2y^2 = 1$.

B $x^2 + 4y^2 = 16$.

C $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 8$.



Problema 3


Dado o cuadrilátero ABCD de vértices os puntos A(3,0), B(1,4), C(-3,2) e D(-1,-2), pídense:

Dado el cuadrilátero ABCD de vértices los puntos A(3,0), B(1,4), C(-3,2) y D(-1,-2), se pide:

- 11.** Ache o ángulo que forman os vectores CB e CD.

Halle el ángulo que forman los vectores CB y CD.

- A** 60° .
- B** 90° .
- C** 120° .



- 12.** Ache o perímetro do cuadrilátero ABCD.

Halla el perímetro del cuadrilátero ABCD.

- A** 12,69 unidades.
- B** 16,50 unidades.
- C** 17,89 unidades.

- 13.** Ache a pendente e a ordenada na orixe da recta DB.

Halle la pendiente y la ordenada en el origen de la recta DB.

- A** A pendente é 3 e a ordenada na orixe 1.
La pendiente es 3 y la ordenada en el origen 1.
- B** A pendente é 3 e a ordenada na orixe 4.
La pendiente es 3 y la ordenada en el origen 4.
- C** A pendente é 4 e a ordenada na orixe 1.
La pendiente es 4 y la ordenada en el origen 1.



14. Cal das seguintes ecuacións corresponde á recta CA?

¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la recta CA?

- A** $y = 3x - 1$.
- B** $x + 3y - 3 = 0$.
- C** $x + 3y + 3 = 0$.

15. Ache a área do triángulo ABC

Halle el área del triángulo ABC

- A** 20 unidades cadradas.
20 unidades cuadradas.
- B** 10 unidades cadradas.
10 unidades cuadradas.
- C** 5 unidades cadradas.
5 unidades cuadradas.



Problema 4

Os datos relativos á altura en cm (x_i) e ao peso en quilogramos (y_i) de doce persoas están recollidos na seguinte táboa:

Los datos relativos a la altura en cm (x_i) y al peso en kilogramos (y_i) de doce personas están recogidos en la siguiente tabla:

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i \cdot y_i$
164	68	26.896	4.624	11.152
166	72	27.556	5.184	11.952
168	75	28.224	5.625	12.600
170	68	28.900	4.624	11.560
172	75	29.584	5.625	12.900
174	76	30.276	5.776	13.224
175	73	30.625	5.329	12.775
176	72	30.976	5.184	12.672
176	80	30.976	6.400	14.080
178	75	31.684	5.625	13.350
180	80	32.400	6.400	14.400
182	79	33.124	6.241	14.378
Suma	2.081	893	361.221	66.637
				155.043

- 16.** Ache a mediana e a moda da variable x (alturas).

Halle la mediana y la moda de la variable x (alturas).

- A** Mediana: 174,5. Moda: 176.
B Mediana: 174. Moda: 176.
C Mediana: 176. Moda: 174,5.

- 17.** Calcule, utilizando a recta de regresión de y sobre x, o peso estimado para unha persoa que mida 190 cm.

Calcule, utilizando la recta de regresión de y sobre x, el peso estimado para una persona que mida 190 cm.

- A** 79,28 Kg.
B 80,23 Kg.
C 82,58 Kg.

- 18.** Cal é a probabilidade ao lanzar un dado, de obter un número que sexa par e múltiplo de 3?

¿Cuál es la probabilidad al lanzar un dado, de obtener un número que sea par y múltiplo de 3?

- A** 1/2
B 1/3
C 1/6



- 19.** Se a probabilidade de que un alumno aprobe as probas de acceso é do 90 % e un instituto presenta 150 alumnos a esa proba, ache o número de alumnos que se espera que aproben.

Si la probabilidad de que un alumno apruebe las pruebas de acceso es del 90 % y un instituto presenta 150 alumnos a dicha prueba, halle el número de alumnos que se espera que aprueben.

A 90 alumnos.

B 135 alumnos.

C 140 alumnos.

- 20.** Nun cuestionario de dez preguntas só hai que contestar "sí" ou "non". Ache a probabilidade de que, sen coñecer ningunha resposta, se acerten polo menos sete preguntas.

En un cuestionario de diez preguntas sólo hay que contestar "sí" o "no". Halle la probabilidad de que, sin conocer ninguna respuesta, se acierten al menos siete preguntas.

A 0,1718

B 0,2223

C 0,2517